



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA**

**“ABORDAJE NUTRICIONAL EN PACIENTES CON CIRUGÍA  
BARIÁTRICA. UN ESTUDIO DE REVISIÓN”**

Requisito previo para optar por el Título de Licenciado en Nutrición y Dietética

**Modalidad:** Artículo Científico

**Autor:** Aguilar Morales Bryan Javier

**Tutora:** ND. Mg. Guevara Villacis, Mishelts Vanessa

**Ambato – Ecuador**

**Septiembre 2023**

## **APROBACIÓN DEL TUTOR**

En calidad de Tutor del trabajo de investigación sobre el tema:

**“ABORDAJE NUTRICIONAL EN PACIENTES CON CIRUGÍA BARIÁTRICA. UN ESTUDIO DE REVISIÓN”** desarrollado por Aguilar Morales Bryan Javier, estudiante de la Carrera de Nutrición y Dietética, considero que reúne los requisitos técnicos, científicos y méritos para pasar al siguiente eslabón, que es la evaluación del jurado examinador quien será designado por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Ambato, septiembre del 2023

LA TUTORA

---

ND. Mg. Guevara Villacis, Mishelts Vanessa

## **AUTORÍA DEL TRABAJO DE GRADO**

Los criterios emitidos en el Informe de Investigación: **“ABORDAJE NUTRICIONAL EN PACIENTES CON CIRUGÍA BARIÁTRICA. UN ESTUDIO DE REVISIÓN”**, así como los contenidos, análisis, resultados, conclusiones plasmadas en este documento son de mi autoría y de mi responsabilidad, como autor de este trabajo de grado.

Ambato, septiembre del 2023

EL AUTOR

---

Aguilar Morales Bryan Javier

## CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Yo, ND. Mg. Guevara Villacis, Mishelts Vanessa con CC: 1600324634 en calidad de autora y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación **“ABORDAJE NUTRICIONAL EN PACIENTES CON CIRUGÍA BARIÁTRICA. UN ESTUDIO DE REVISIÓN”**, Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que haga de este Artículo de Revisión o parte de él, un documento disponible con fines netamente académicos para su lectura, consulta y procesos de investigación.

Cedo una licencia gratuita e intransferible, así como los derechos patrimoniales de mi Artículo de Revisión a favor de la Universidad Técnica de Ambato con fines de difusión pública; y se realice su publicación en el repositorio Institucional de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, siempre y cuando no suponga una ganancia económica y se realice respetando mis derechos de autora, sirviendo como instrumento legal este documento como fe de mi completo consentimiento.

Ambato, septiembre 2023

---

ND. Mg. Guevara Villacis, Mishelts Vanessa

CC: 1600324634

## CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Yo, Aguilar Morales Bryan Javier con CC: 1850832732 en calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación **“ABORDAJE NUTRICIONAL EN PACIENTES CON CIRUGÍA BARIÁTRICA. UN ESTUDIO DE REVISIÓN”**, Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que haga de este Artículo de Revisión o parte de él, un documento disponible con fines netamente académicos para su lectura, consulta y procesos de investigación.

Cedo una licencia gratuita e intransferible, así como los derechos patrimoniales de mi Artículo de Revisión a favor de la Universidad Técnica de Ambato con fines de difusión pública; y se realice su publicación en el repositorio Institucional de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, siempre y cuando no suponga una ganancia económica y se realice respetando mis derechos de autora, sirviendo como instrumento legal este documento como fe de mi completo consentimiento.

Ambato, septiembre 2023

---

Aguilar Morales Bryan Javier

CC: 1850832732

## **APROBACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR**

Los miembros del Tribunal Examinador aprueban el Informe de Investigación con el Tema: **“ABORDAJE NUTRICIONAL EN PACIENTES CON CIRUGÍA BARIÁTRICA. UN ESTUDIO DE REVISIÓN”** desarrollado por Aguilar Morales Bryan Javier, estudiante de la Carrera de Nutrición y Dietética, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Técnica de Ambato.

Ambato, septiembre del 2023

Parar su constancia firman:

-----  
Presidente

-----  
1er Vocal

-----  
2 do Vocal

**Ciudadanos.**

Bryan Javier Aguilar Morales

Mishelts Vanessa Guevara Villacís

**Presente. -**

**CARTA DE ACEPTACIÓN DE ARTÍCULO**

Saludos cordiales;

Por medio de la presente me dirijo a ustedes en mi calidad de Editora de la **Revista de Salud VIVE** con el propósito de notificarles que su artículo titulado: "**Abordaje nutricional en pacientes con cirugía bariátrica**", ha sido aceptado para ser publicado en la Revista **VIVE** en el volumen 6, Número 17, correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2023.

Constancia que se expide a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil veintitrés.



Centro de Estudios  
Transdisciplinarios Bolivia  
**CET-BOLIVIA**

Prof. Doris Lisbeth Vilaiba Fermin (MSc.)  
**DIRECTORA EDITORIAL**

## DEDICATORIA

*El presente trabajo de investigación va dedicado a Dios quien con su bondad ha sabido guiarme y cuidar de mí.*

*A mis padres, Mayra y Esteban, quienes han sido mi motivación cada día de mi vida; con sus consejos y vivencias; y lo más importante con su amor incondicional y ejemplo he podido llegar a ser quien soy hoy.*

*A mi hermana, Camila, amiga fiel e incondicional que ha sido mi apoyo y motor de vida.*

*Y finalmente a mis abuelitos José e Irma que han cuidado de mí durante todos estos años y me han brindado todo su amor.*



## AGRADECIMIENTO

*Agradezco a mis padres y hermana por no dejarme solo en ningún momento, por siempre estar ahí siendo mi apoyo y mi guía.*

*A mis mejores amigas Francisned y María Gabriela, por ser mi equipo incondicional y mi respaldo a lo largo de toda la carrera*

*A mis amigas de internado Vero, Taty, Ani y Ali, gracias por compartir enseñanzas, consejos y experiencias inolvidables.*

*Por último, agradezco a mi tutora ND. Mg. Mishelts Guevara, que supo guiarme y aconsejarme para poder culminar con mi trabajo.*

# **“ABORDAJE NUTRICIONAL EN PACIENTES CON CIRUGÍA BARIÁTRICA. UN ESTUDIO DE REVISIÓN”**

Aguilar Morales Bryan Javier \*

[\\*baguilar2732@uta.edu.ec](mailto:*baguilar2732@uta.edu.ec)

## **RESUMEN**

El presente trabajo investigativo se enfoca en como los pacientes sometidos a cirugía bariátrica, un procedimiento quirúrgico usado en el tratamiento de la obesidad mórbida, no son capaces de llevar una dieta adecuada tanto antes como después de la operación, no logrando cumplir los requerimientos adecuados de nutrientes que su cuerpo necesita luego de los cambios fisiológicos y metabólicos que ocurren después de la intervención.

Por lo que, el principal objetivo de esta revisión fue investigar y analizar la importancia de contar con un tratamiento nutricional específico para este tipo de pacientes, con el fin de potenciar y mejorar los resultados de la cirugía y mejorar su estado de salud y bienestar a largo plazo. Es así que, se realizó una búsqueda completa de la literatura científica disponible en bases de datos altamente relevantes, recolectando información con adecuada calidad metodológica, que permita comprender la necesidad de adaptar un plan nutricional antes de la cirugía para evitar complicaciones durante la misma, y después de esta, que ayude a que el organismo del paciente se adapte al cambio.

Se resaltó así, la importancia de un enfoque integral en el abordaje nutricional de estos pacientes, evidenciando una falta de información general sobre la dieta adecuada que se debería de llevar, en muchos casos, restándole importancia al aspecto nutricional, lo que conlleva a complicaciones y a una recuperación del peso que se tenía antes de la cirugía, se hace por tanto, especial énfasis en la necesidad de un seguimiento a largo plazo, en la que se demuestre que las visitas continuas a consulta nutricional y la educación del paciente, fomenta cambios en el estilo de vida sostenibles, que no incluya dietas restrictivas que no se puedan llevar.

**PALABRAS CLAVES:** CIRUGÍA BARIÁTRICA, OBESIDAD, MALNUTRICIÓN, DIETA

## **“NUTRITIONAL APPROACH IN PATIENTS WITH BARIATRIC SURGERY”**

### **ABSTRACT**

The present investigative work focuses on how patients undergoing bariatric surgery, a surgical procedure used in the treatment of morbid obesity, are not able to eat an adequate diet both before and after the operation, failing to meet the adequate requirements of nutrients that your body needs after the physiological and metabolic changes that occur after the intervention.

Therefore, the main objective of this review was to investigate and analyze the importance of having a specific nutritional treatment for this type of patients, in order to enhance and improve the results of surgery and improve their state of health and well-being. long term. Thus, a complete search of the scientific literature available in highly relevant databases was carried out, collecting information with adequate methodological quality, which allows understanding the need to adapt a nutritional plan before surgery to avoid complications during it, and after this, to help the patient's body adapt to the change.

Thus, the importance of a comprehensive approach in the nutritional approach of these patients was highlighted, evidencing a lack of general information on the proper diet that should be followed, in many cases, downplaying the nutritional aspect, which leads to complications and a recovery of the weight that was had before surgery, therefore, special emphasis is made on the need for long-term follow-up, in which it is demonstrated that continuous visits to nutritional consultation and patient education, promote changes in the sustainable lifestyle, which does not include restrictive diets that cannot be carried.

**KEYWORDS:** BARIATRIC SURGERY, OBESITY, MALNUTRITION, DIE

## INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, se ha logrado observar un grave aumento en la prevalencia de obesidad en la población mundial, afectando a millones de personas de todas las edades, llegándose a considerar actualmente, como “pandemia”, desencadenando múltiples comorbilidades y con ello reduciendo las expectativas de vida en aquellos que la padecen.

En esta perspectiva la obesidad se sitúa como una patología crónica, sistémica, multifactorial y progresiva en la que existe una acumulación irregular o desmedida de tejido adiposo en el cuerpo, que se da a partir de factores como lo son: genéticos, metabólicos, sociales, conductuales, psicológicos y culturales, y que a su vez puede actuar también como un factor de riesgo en aquellas personas que cuentan ya con alguna enfermedad crónica degenerativa (1). Generalmente, en adultos, la obesidad se diagnostica sencillamente a través del cálculo del IMC (Índice de Masa Corporal), el cual, al encontrarse en un valor mayor o igual a  $30 \text{ kg/m}^2$  es compatible con obesidad, existe una subclasificación detallada, en la cual la obesidad tipo I registra un IMC de  $30\text{-}34,9 \text{ kg/m}^2$ , obesidad tipo II con un IMC de  $35\text{-}39,9 \text{ kg/m}^2$  y obesidad tipo III con un  $\text{IMC} \geq 40 \text{ kg/m}^2$ , esta organización permite estadificar nutricionalmente al paciente y a partir de ello elegir el mejor tratamiento de forma individualizada (2).

A nivel mundial y según datos de la OMS, en el año 2016, más de 1900 millones (39%) de personas mayores de 18 años tenían sobrepeso y de estos al menos 650 millones (13%) padecían obesidad, estas cifras son alarmantes, la misma OMS confirmó que al menos 340 millones de niños y adolescentes tenían sobrepeso o eran obesos (2); de igual forma, la OPS reporta que en América Latina y el Caribe, uno de cada cuatro adultos, padecen de obesidad, esto representa al menos a 106 millones de personas de esta región, y en 2020, 3,9 millones de niños y niñas fueron diagnosticados con sobrepeso infantil, de los cuales 7,5% son menores de cinco años, mostrándose que América del Sur cuenta con la mayor prevalencia de sobrepeso en este grupo (3).

En Ecuador, solo en el 2018 ENSANUT reporta que, al menos 35 de cada 100 niños de 5 a 11 años presentan sobrepeso y obesidad, no obstante, es más prevalente durante los 40 y 50 años de edad, observándose que 6 de cada 10 ecuatorianos adultos la manifiestan; se menciona que, esto se vincula a un 30-40% al sedentarismo, y mayoritariamente, a un inadecuado consumo de alimentos, especialmente con un elevado nivel de calorías (4).

El primer escalón en el tratamiento de la obesidad es intervenir en el estilo de vida priorizando los cambios dietéticos y el incremento de la actividad física, no obstante, ciertos casos podrían requerir tratamientos farmacológicos, según García et al (5), la terapia farmacológica y nutricional, reduce hasta un 10% el peso corporal a medio plazo, sin embargo, se ha observado un fracaso a largo plazo, y especialmente, en aquellos que sufren de obesidad tipo II y obesidad mórbida, es decir, quienes cuentan con un IMC mayor o igual a  $35 \text{ kg/m}^2$ .

Por esta razón, el tratamiento quirúrgico mediante cirugía bariátrica es actualmente el método por excelencia que permite reducir de gran manera el exceso de peso corporal en pacientes con formas graves de obesidad, mitigando o reduciendo así las comorbilidades más frecuentes como diabetes mellitus tipo II, hipertensión arterial, dislipidemias, esteatosis hepática, entre otros. El procedimiento quirúrgico involucra dos técnicas, las restrictivas, que disminuyen la capacidad gástrica y provocan saciedad precoz, y las malabsortivas, que alteran la normal mezcla del quimo intestinal con las secreciones digestivas y pancreáticas (6).

En la actualidad, parte del éxito de la cirugía bariátrica depende del manejo nutricional posquirúrgico, puesto que, en la mayoría de estos procedimientos, se observan deficiencias nutricionales tanto de macro como de micronutrientes, los pacientes suelen permanecer con inadecuados hábitos alimentarios y brindándole poca importancia a la atención nutricional, resultando en una baja adherencia al plan alimentario y por consiguiente cayendo nuevamente en un estado nutricional inadecuado (7,8).

La presente revisión sistemática pretende analizar el régimen alimentario que deben llevar aquellos pacientes intervenidos mediante cirugía bariátrica, a fin de sostener el tratamiento quirúrgico y mejorar los hábitos alimentarios.

## **METODOLOGÍA**

Se trata de un estudio descriptivo, no experimental, basado en la aplicación del método PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analysis) a través del cual se realizó una meticulosa revisión y análisis de investigaciones publicadas en bases de datos altamente relevantes, considerando a todas aquellas publicaciones con 5 años de antigüedad, que discutan sobre la nutrición en cirugía bariátrica (9).

Para determinar la importancia de la información encontrada sobre el manejo nutricional en el contexto de un paciente intervenido mediante cirugía bariátrica se realizó una amplia búsqueda en diferentes bases científicas como: Biblioteca Cochrane, SCOPUS, PubMed, de igual forma se revisó información en revistas de alto impacto como, por ejemplo: Revista de Nutrición Clínica y Metabolismo, Nutrición Hospitalaria, Revista Médica Cubana, Revista de Cirugía General. La estrategia de búsqueda se basó en la combinación de los descriptores del Medical Subjects Headings (MeSH) referentes a “Nutricion and bariatric surgery” or “Nutrición y cirugía bariátrica”.

Los criterios de inclusión para la revisión sistemática fueron: publicaciones en idioma español e inglés, rango de edad de pacientes estudiados entre 14,3 a +/- 65 años, que incluya el tipo de cirugía bariátrica, IMC promedio, pérdida de peso postcirugía, seguimiento postquirúrgico desde los 4 meses hasta los 10 años, y publicaciones realizadas a partir del año 2018 hasta la actualidad (marzo 2023). Como criterios de exclusión: publicaciones en idioma italiano y francés, así como aquellas realizadas antes del año 2018, estudios sin relevancia nutricional en relación con pacientes intervenidos

mediante cirugía bariátrica, metodología no acorde al diseño del estudio, tesis de grado y artículos que no se encuentran disponibles.

La selección de artículos se basó en un análisis minucioso del título, resumen del artículo, pudiendo elegir aquellos que comprenden las variables de estudio y su relevancia para el propósito de la revisión. Además, se tomaron en consideración ciertos factores como la estadificación de la obesidad, los criterios para la elección del tipo de cirugía bariátrica, y el seguimiento nutricional prequirúrgico y postquirúrgico, para establecer parámetros e indicadores dietéticos con relación a este grupo de pacientes expuestos a cirugía bariátrica.

### **Evaluación de calidad metodológica**

Para evaluar la calidad metodológica se utilizó, la Critical Review Form Quantitative Studies: CRF-QS, caracterizada por contener 19 criterios, válidos tanto para estudios de tipo cuantitativo como cualitativo, los parámetros que utiliza esta escala metodológica son los siguientes: finalidad o propósito del estudio, aquí se evalúan los objetivos que pretende alcanzar la investigación, a continuación, se analiza la literatura de fondo, así como el diseño, la calidad metodológica, sesgos, se indaga también sobre la muestra, aquí hay varios criterios que se evalúan como, tamaño de la muestra justificado, obtención del consentimiento informado, descripción de la muestra, entre otros, finalmente se considera la medición de resultados, si son apropiados a los objetivos propuestos, si los datos estadísticos son significativos, si los métodos, conclusiones o implicaciones clínicas están acorde al alcance del estudio. Todos los criterios ya mencionados se califican bajo la siguiente categoría; pobre calidad metodológica  $\leq 11$ , aceptable calidad metodológica de 12-13, buena calidad metodológica de 14-15, muy buena calidad metodológica de 16-17, excelente calidad metodológica  $\geq 18$ .

**Tabla 1.** Evaluación de la Calidad Metodológica


Autor	CRITERIOS																			Total	Total %	Categoría Calidad Metodológica
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Hernández J, et al. 2018	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	17/19	89,47%	MUY BUENA
Pardo B, et al. 2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	18/19	89,47%	EXCELENTE
Nieto J, et al. 2018	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	17/19	89,47%	MUY BUENA
Johnson L, et al. 2019	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	16/19	89,47%	MUY BUENA
Damin D, et al. 2021	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	17/19	89,47%	MUY BUENA
Palacio AC, et al. 2021	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	18/19	89,47%	EXCELENTE
Ağbaba N, et al. 2022	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	16/19	94,73%	MUY BUENA
Godoy C, et al. 2018	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	16/19	84,21%	MUY BUENA
Gils A, et al. 2018	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17/19	84,21%	MUY BUENA
Sivakumar J, et al. 2019	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	18/19	84,21%	EXCELENTE
Zekiye N, et al. 2022	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	17/19	89,47%	MUY BUENA
Lee C, et al. 2019	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	17/19	89,47%	MUY BUENA
De la Cruz N, et al. 2022	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	17/19	89,47%	MUY BUENA
Bandeira A, et al. 2018	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	17/19	94,73%	MUY BUENA
Jans G, et al. 2018	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	17/19	84,21%	MUY BUENA

0: criterio no cumplido; 1: criterio cumplido

Categoría calidad: pobre calidad metodológica ≤ 11, aceptable calidad metodológica de 12-13, buena calidad metodológica de 14-15, muy buena calidad metodológica de 16-17, excelente calidad metodológica ≥ 18

## Selección de artículos

Mediante un análisis previo de la información obtenida a través de la búsqueda de información se establece que de 141 resultados 106 fueron excluidos debido a que no aportaban información relacionada con la nutrición y la cirugía bariátrica, el idioma era portugués, y la metodología no era apropiada al diseño de la revisión. Posteriormente se excluyeron 20 al no estar disponible el artículo, al ser tesis de grado, además de ser estudios que profundizan sobre la cirugía bariátrica pero no relacionan esta temática con el abordaje nutricional. Finalmente se seleccionaron 15 artículos con información relevante para esta revisión (Figura 1).



**Figura 1.** Evaluación Metodológica basada en la declaración PRISMA, herramienta utilizada para la identificación, selección y categorización de estudios realizados.



## **DESARROLLO Y DISCUSIÓN**

A continuación en la Tabla 2, se muestra las principales características que se utilizaron al momento de abordar el tema en cuestión relacionando el abordaje nutricional con los pacientes intervenidos mediante cirugía bariátrica, de esta manera; el rango de edad de los participantes que se presentan en los estudios oscila entre los 14,3 +/- 65 años, el rango de tiempo de estudio realizado se da desde los 4 meses hasta los 10 años de duración, se diferencia el tipo de cirugía y el IMC, el cual en todos los estudios involucrados es mayor a 30 kg/m<sup>2</sup>, se exponen las principales aportaciones que ofrece cada estudio, principalmente, en materia de nutrición.

Tabla 2. **Principales características y aportaciones de los artículos.**

Título del artículo	Autores y año	Promedio de edad	Tiempo	Tipo de cirugía	IMC promedio	Pérdida de peso (PP)	Perspectiva Nutricional
Efectos metabólicos en pacientes obesos posoperados de bypass gástrico laparoscópico: 5 años de experiencia en un hospital de tercer nivel	Hernández J, et al. (10) 2018	41 años	12 meses	BGRY	Pacientes no diabéticos: 47,3 a 31,4 kg/m <sup>2</sup> Pacientes diabéticos: 46 a 30,3 kg/m <sup>2</sup>	Pacientes no diabéticos: 124 kg a 80,2 kg Pacientes diabéticos: 118,4 kg a 79,6 kg	Luego de 12 meses de la cirugía los pacientes manejaron una dieta hipograsa, hiposódica e hiperproteica aportando al beneficio de la cirugía bariátrica
Tratamiento nutricional hiperproteico precirugía bariátrica en obesidad mórbida	Pardo B, et al. (11) 2018	35,1 años	4 meses	Cirugía bariátrica	Pacientes NP: Reducción de 45,32 a 43,48 kg/m <sup>2</sup> Pacientes HP: Reducción de 46,14 a 43,7 kg/m <sup>2</sup>	Pacientes NP: Reducción de 120,2 kg a 115,21 kg Pacientes HP: Reducción de 120,17 kg a 113,83 kg	La dieta hipocalórica hiperproteica no muestra ventajas en la reducción de peso y grasa corporal, así como en la ganancia de masa muscular, en comparación con la dieta hipocalórica normoproteica.
Efectos sobre el perfil metabólico: Reporte del primer grupo de cirugía bariátrica	Nieto J, et al. (12) 2018	14,3 años	2 años	Gastrectomía vertical laparoscópica en manga	Reducción de 44,41 a 34 kg/m <sup>2</sup>	Reducción de 117,3 kg a 92,9 kg	Al primer y segundo año la reducción de peso fue de 33% y 23% respectivamente, el 20% de pacientes permanecieron con obesidad grave a los 2 años postoperatorios pues no realizaron seguimiento nutricional.

Título del artículo	Autores y año	Promedio de edad	Tiempo	Tipo de cirugía	IMC promedio	Pérdida de peso (PP)	Perspectiva Nutricional
Analysis of vitamin levels and deficiencies in bariatric surgery patients: a single-institutional analysis	Johnson L, et al. (13) 2019	MG: 41 ± 11,8 años BGRY: 45,6 ± 13 años	1 año postoperatorio	MG y BGRY	MG Pre-IMC: 47,2 ± 7,6 kg/m <sup>2</sup> BGRY Pre-IMC: 44,3 ± 7,2 kg/m <sup>2</sup>	-----	La mayor deficiencia se presentó en la vitamina A, en pacientes con BGRY en el preoperatorio presentaron 1,7% de deficiencia y a un año de la operación fue de 7,7%, mientras que de MG fue de 2,7% al inicio y al año de 5,2%, resulta necesario el manejo nutricional
Weight regain in association with macronutrient diet composition and quality of life in women at least 5 years after bariatric surgery	Damin D, et al. (14) 2021	42,6 años	5 años después de CB	BGRY	Promedio de IMC perdido en 1 año: 43,1 a 29,3 kg/m <sup>2</sup>	Promedio de peso perdido en 1 año: 111.4 a 77,6 kg	Con el BGRY se tuvo una pérdida de 33,8 kg de peso y de 13,8 kg/m <sup>2</sup> en IMC, durante 5 años de tratamiento postoperatorio. Entre las mujeres en quienes se hizo seguimiento, al menos un tercio de ellas presentó alguna recuperación de peso de acuerdo en cuestiones dietéticas apropiadas por el seguimiento nutricional a diferencia con otros estudios.
Ingesta calórica y de macronutrientes en los primeros seis meses post cirugía bariátrica	Palacio AC, et al. (15) 2021	35,2 años	1, 2 y 6 meses postoperatorios	BGRY y MG	-----	MG: 1er mes: -15,6 kg 6to mes: -4,3 kg BGRY: 1er mes: -32,3 kg 6to mes: -4,6 kg	El presente estudio muestra una baja ingesta de calorías y de macronutrientes durante los primeros 6 meses del postoperatorio en ambas técnicas. Durante el primer mes el aporte calórico es cercano a las 500 kcal/día, en el segundo mes 600 kcal/día y sexto mes 830 kcal/día. Con respecto a las proteínas, ninguna de las

técnicas analizadas logra cubrir el mínimo esperado (60 g al día), excepto al 6° mes del BPG.

Título del artículo	Autores y año	Promedio de edad	Tiempo	Tipo de cirugía	IMC promedio (PP)		Pérdida de peso		Perspectiva Nutricional
Determining the relationship of diet quality with weight change, body mass index, and depression in women who had undergone sleeve gastrectomy: a cross-sectional descriptive study	Agbaba N, et al. (16) 2022	33,6 años	1 año postoperatorio	MG	Antes de la cirugía: 45,1 kg/m <sup>2</sup> ± 5,7	Antes de la cirugía: 125,7 kg ± 19,9	1er año postoperatorio: 28,6 kg/m <sup>2</sup> ± 4,5	1er año postoperatorio: 79,5 kg ± 14,0	Con la MG después del primer año postoperatorio se obtuvo una pérdida de peso del 36,7% y una reducción del IMC del 36,6% debido a una dieta individualizada, por tanto, el manejo dietético contribuye al éxito de la cirugía y a superar cuadros emocionales como la depresión en el paciente
Food Tolerance and Eating Behavior After Roux-en-Y Gastric Bypass Surgery	Godoy C, et al. (17) 2018	42,3 años	4,9 años postoperatorio	BGRY	33,3 kg/m <sup>2</sup>		88,1 ± 18,4 kg		Para evaluar la adaptación a la cirugía BGRY, se debe investigar la asociación de los ciclos, tiempos, eficiencia de masticación, y la ingesta de proteínas, en asociación con la tolerancia a los alimentos
Effects of Two Preoperative Weight Loss Diets on Hepatic Volume, Metabolic Parameters, and Surgical Complications	Gils A, et al. (18) 2018	45,3 ± 10,1 años	21 días antes de la cirugía	BGRY y MGL	Grupo DMBC inicio 47,2 ± 5,4 kg/m <sup>2</sup>	Grupo DBC inicio 47,2 ± 5,0 kg/m <sup>2</sup>	Después de 21 días 44,5 ± 5,6 kg/m <sup>2</sup>	Después de 21 días 45,2 ± 4,8 kg/m <sup>2</sup>	A pesar de que una dieta muy baja en calorías tiene un mayor impacto en la reducción del peso preoperatorio (hasta un 5,8% en solo 21 días), esta no tiene diferencias en cuanto a la reducción del volumen hepático, parámetros bioquímicos, complicaciones quirúrgicas y duración de la estancia
					Grupo VLCD (dieta muy	Grupo LCD			

in Morbid  
Obese Bariatric  
Surgery  
Candidates: a  
Randomized  
Clinical Trial

baja en  
calorías)  
inicio  
131,2 ± 22,4  
kg

(dieta  
baja en  
calorías)  
inicio  
126,2 ±  
17,1 kg

Después de  
21 días  
123,6 ± 21,0  
kg

Después  
de 21  
días  
120,8 ±  
16,0 kg

hospitalaria, en relación con una  
dieta baja en calorías.

Título del artículo	Autores y año	Promedio de edad	Tiempo	Tipo de cirugía	IMC promedio	Pérdida de peso (PP)	Perspectiva Nutricional	
Body Composition Changes Following a Very-Low-Calorie Pre-Operative Diet in Patients Undergoing Bariatric Surgery	Sivakumar J, et al. (19) 2019	43,5 años	2 semanas pre y postoperatorias	Cirugía bariátrica	IMC precirugía: 43,4 kg/m <sup>2</sup> Peso precirugía: 121,6 kg	IMC postcirugía: 41,8 kg/m <sup>2</sup> Peso postcirugía: 117,2 kg	A pesar de que se observa una significativa reducción de peso preoperatorio en estos pacientes, alrededor de 4,5 kg en dos semanas, con una dieta muy baja en calorías, se pierde más masa magra (2,8 kg) que grasa (1,7 kg), por lo que, se necesita de más estudios para conocer las implicaciones clínicas de esta rápida pérdida de masa corporal	
Comparison of a pre-bariatric surgery very low-calorie ketogenic diet and the Mediterranean diet effects on weight loss, metabolic parameters, and liver size reduction	Zekiye N, et al. (20) 2022	18 – 65 años	2 semanas preoperatorias	Cirugía bariátrica	Pre – IMC (DCMBC) 47,8 kg/m <sup>2</sup>  Pre – Peso (DCMBC) 125,3 kg	Pre – IMC (DM) 49,7 kg/m <sup>2</sup>  Pre – Peso (DM) 135 kg	Post – IMC (DCMBC) 45,8 kg/m <sup>2</sup>  Post – IMC (DM) 48,9 kg/m <sup>2</sup>  Post – Peso (DCMBC) 114 kg  Post – Peso (DM) 131 kg	Este estudio indica que la dieta DCMBC es capaz de reducir el tamaño del hígado, además, debido a su alto contenido de proteína de suero y un equilibrio de macro y micronutrientes, es más efectivo que la DM para reducir el peso antes de la cirugía bariátrica, sin embargo, su adherencia es mucho más complicada para los pacientes y puede presentar problemas gastrointestinales en algunos grupos
Changes in Gut Microbiome	Lee C, et al. (21) 2019	G1, PPM: 56 años	9 meses	BGA y BGRY	G1-IMC: 31 – 40,5 kg/m <sup>2</sup> G2-IMC: 33 – 37,6 kg/m <sup>2</sup>	Peso-G1: 109,8 kg PP-G1: 6,3%	Se observó que tanto el grupo de PPM como el grupo de	

after Bariatric Surgery Versus Medical Weight Loss in a Pilot Randomized Trial

G2, BGA:  
45 años  
G3, BGRY:  
57 años

G3-IMC: 31,3-38,6 kg/m<sup>2</sup>

Peso-G2: 98,7 kg  
PP-G2: 9,9 %

Peso-G3: 94,2 kg  
PP-G3: 10 %

BGRY tuvieron un aumento de colonias en la microbiota intestinal, mientras que, en el grupo de BGA, se vio una reducción de estas.

Título del artículo	Autores y año	Promedio de edad	Tiempo	Tipo de cirugía	IMC promedio	Pérdida de peso (PP)	Perspectiva Nutricional
Long-Term Outcomes after Adolescent Bariatric Surgery	De la Cruz N, et al. (22) 2022	18,8 ± 1,6 años	10 años	MG, BGAL y BGRY	Pre-IMC: 44,7 kg/m <sup>2</sup> Actual-IMC: 31,7 kg/m <sup>2</sup>	De 278,5 a 195 lbs	Se observó una reducción de peso del 31,3% en el grupo BGRY y de 22,5% en el grupo BGAL, además de presentarse un 100% de remisión en pacientes con hiperlipidemia, asma y diabetes. A pesar de que la cirugía bariátrica puede resultar en una opción invasiva para los adolescentes, esta es una herramienta segura y efectiva que puede mejorar el peso, las comorbilidades asociadas y hasta el estado psicológico en este grupo etario asociándolo con un manejo nutricional minucioso.
Deficiencias de micronutrientes después de la cirugía bariátrica: análisis comparativo entre gastrectomía en manga y bypass gástrico en Y de Roux.	Bandeira A, et al. (23) 2018	MG: 37,2 ± 11 años BGRY: 41,9 ± 11,1 años	3 a 12 meses postoperatorio	MG) y BGRY	Pre-IMC MG: 39,4 ± 2,6 kg/m <sup>2</sup> Pre-IMC BGRY: 42,7 ± 5,9 kg/m <sup>2</sup>	% Pérdida de peso MG: 81,1% % Pérdida de peso BGRY: 88,1%	Pacientes sometidos a MG, tienen niveles séricos más bajos de hierro (6.6% de deficiencia) y zinc (6.6%), que los sometidos a BGRY (deficiencia de 15% en hierro y 30% en zinc), sin embargo, ambos presentan deficiencias de otros micronutrientes, por lo que, en estos procedimientos se necesita soporte nutricional

Bariatric Surgery Does Not Appear to Affect Women's Breast-Milk Composition	Jans G, et al. (24) 2018	18 – 45 años	31 meses entre la cirugía y concepción	BGAL y BGRY	IMC Pre-concepcional: 28 ± 4 kg/m <sup>2</sup>	Máx pérdida de peso postoperatoria 37 ± 9 kg	No hubo evidencias que indicaran que la composición de la leche materna resulta inadecuada en aquellas mujeres que fueron sometidas a cirugía bariátrica, sin embargo, se deben realizar más estudios.
---	--------------------------	--------------	--	-------------	---	---	--

IMC: Índice de masa corporal; NP: Normoproteica; HP: Hiperproteica; BGRY: Bypass gástrico de Roux-en-Y; MG: Manga gástrica; BGAL: Banda gástrica ajustable laparoscópica; DCMBC: Dieta cetogénica muy baja en calorías; DM: Dieta mediterránea; PPM: Pérdida de peso médica; BGA: Banda gástrica ajustable; DMBC: Dieta muy baja en calorías; DBC: Dieta baja en calorías; MGL: Manga gástrica laparoscópica

Analizando los artículos se puede identificar que todos los pacientes, sin importar su edad, cumplieran con el diagnóstico de obesidad u obesidad mórbida, es decir, tenían un IMC de 30 kg/m<sup>2</sup> o >40 kg/m<sup>2</sup>, esto sea ya por el consumo excesivo de macronutrientes o por alguna situación patológica relacionada con el metabolismo en la que no se pueda controlar el aumento de peso, así también, existen diferencias marcadas en las poblaciones estudiadas, que dan como resultado un estado nutricional diferente según el tiempo, tipo de cirugía, pérdida de peso postcirugía y comorbilidades asociadas. De los 15 artículos revisados, 12 de ellos (11,16 - 18,23) presentan poblaciones que padecen obesidad mórbida por lo que la reducción de su IMC es clave para evitar patologías asociadas; y en al menos 3 de estos (11, 18, 20) se utilizan dietas cuyas características difieren una de la otra, y dependerán de las condiciones fisiológicas propias de cada individuo.

Es así como, Pardo et al. (11) en su estudio, obtuvo que la pérdida de peso para pacientes con cirugía bariátrica que siguieron una dieta normoproteica fue de 4,1% y la ganancia de masa muscular fue de 2,95%, mientras que para aquellos con una dieta hiperproteica la pérdida de peso y la ganancia de masa muscular fue de 5,27% y 3,74% respectivamente, evidenciando así que, no existen diferencias significativas en la pérdida de peso y ganancia de masa muscular para ambos grupos.

En referencia al estudio de Gils et al. (18) realizado en pacientes con obesidad mórbida con un promedio de 45 años de edad, se utilizaron dos tipos de dietas, una dieta muy baja en calorías (DMBC) y una baja en calorías (DBC), observándose una mayor pérdida de peso en el primer grupo,  $-7,65 \pm 2,66$  kg, que en el segundo,  $-5,36 \pm 2,21$  kg. Es importante señalar que, a pesar de que el grupo de DMBC logró reducir más su peso, se mostró una disminución mayor de masa muscular y una reducción de proteínas viscerales, aunque esta última no fue significativa, así también, la poca adherencia y tolerancia que tenían los pacientes a la DMBC, los llevó incluso a tener mareos y debilidad durante las 2 primeras semanas.

Similarmente, Zekiye et al. (20) en su estudio, compara dos tipos de dietas preoperatorias para la pérdida de peso en los pacientes candidatos a cirugía bariátrica, siendo estas la dieta cetogénica muy baja en calorías (DCMBC) y la dieta mediterránea (DM). La DCMBC, obtuvo resultados significativamente mejores a la DM en cuanto a la reducción de peso, en un tiempo muy corto,



pese a esto, se evidenció que puede producir efectos secundarios gastrointestinales, además de la evidente pérdida de músculo en los pacientes, por lo que la DM resulta en una propuesta nutricionalmente más efectiva y saludable.

## **DISCUSIÓN**

Según Palacio et al. (15) después de cualquier procedimiento de cirugía bariátrica, se debe realizar una dieta de progresión, en la cual, va a existir una notable disminución en las porciones de los alimentos en cada tiempo de comida, por tanto, el bajo aporte energético durante el día tanto de macro como de micronutrientes es inevitable, principalmente, durante los primeros 6 meses, además, se menciona que el aporte proteico no cubre las necesidades recomendadas, incluso después de cumplir un año postcirugía. Así mismo, Ağbaba et al. (16) menciona que, la calidad de la dieta va a determinar la adecuada pérdida de peso y la mejora de las comorbilidades preexistentes, adicionalmente, se afirma que la manga gástrica reduce efectivamente el peso del paciente, observándose una mayor pérdida de grasa corporal.

Contreras et al. (18) en su estudio, utiliza una dieta muy baja en calorías, obteniendo un impacto beneficioso en la pérdida de peso preoperatorio, comparándolo con una dieta baja en calorías, no obstante, Sivakumar et al. (18) al aplicar este mismo tipo de dieta, obtiene que la pérdida significativa de peso, se da principalmente por una reducción de la masa muscular de los pacientes, por lo que se entiende, que para recuperarla, se debe seguir una dieta hiperproteica, sin embargo, múltiples estudios (17,20) manifiestan que, lograr un adecuado aporte proteico en estos pacientes es particularmente complicado, debido a la limitada cantidad de alimentos que se consume, por lo que, se debe tener especial cuidado en este tipo de dietas, que pueden conllevar a padecer otro tipo de patologías que no estaban contempladas en el paciente. Es por lo mismo que, la importancia de una dieta adecuada no solo recae en el abordaje postoperatorio, dado que para evitar en lo posible una excesiva pérdida de peso y deficiencias de micronutrientes, se debe reducir el peso del paciente antes del procedimiento quirúrgico, y para esto se han evaluado varios tipos de dietas, cuyos beneficios son diferentes en cada caso.

Adicionalmente, Bandeira et al. (23), evaluaron a dos grupos de pacientes, que fueron sometidos a manga gástrica (MG) y bypass gástrico de Roux-en-Y (BGRY), en dónde reportaron una pérdida de peso de hasta 81,1% en el grupo de MG y un 88,1% en el grupo de BGRY. La mayor pérdida de peso en pacientes de BGRY frente a otros métodos quirúrgico, se ha observado también en el estudio que obtuvo Lee C, et al. (21), en el que comparó el BGRY con la banda gástrica ajustable (BGA), consiguiendo una pérdida de peso ligeramente mayor en la muestra poblacional sometida al primer método quirúrgico. A pesar de esto, al no mencionarse en los estudios el tratamiento nutricional utilizado en cada grupo, no se puede valorar y categorizar el plan alimentario, por lo que se vuelve más complejo diferenciar si la mayor o menor presencia de deficiencias nutricionales se correlaciona en mayor medida al procedimiento quirúrgico utilizado o al inadecuado manejo nutricional.

Sin embargo, Palacio et al. (15), evidencia en su población de estudio una mayor reducción de peso, teniendo pérdidas de 15,6 kg en pacientes con MG, y de hasta 32,3 kg en BGRY, durante el primer mes postoperatorio, es decir, que hubo una pérdida de hasta el doble del peso que el primer procedimiento. Así también, postula que luego de la cirugía se debe realizar una progresión en la dieta, en la que los volúmenes de las porciones irán aumentando de acuerdo al tiempo postcirugía, sin embargo, se enfatiza que incluso a los 6 meses postoperatorios no se logra cubrir la ingesta diaria recomendada de proteínas, por lo que la suplementación proteica se visualiza como una de las posibles y mejores opciones de tratamiento en estos pacientes, que ayudará a la conservación del músculo y la pérdida de tejido adiposo.

Bandeira et al. (23), menciona que, existe una mayor deficiencia de micronutrientes en el grupo de BGRY que en el grupo de la MG, lo que se podría entender como una posible consecuencia del peso perdido; para evitar en lo posible esto, refiere que, se debe iniciar con una terapia de soporte nutricional pre y postoperatoria, en el que se ofrezca un plan alimentario completo e individualizado, pero necesariamente con suplementos multivitamínicos. Como lo realizado por Zekiye et al. (20), en el que al comparar la DCMBC con la DM, se vio en la necesidad de administrar suplementos multivitamínicos y probióticos en la DCMBC, puesto que, aunque demostraba ser la mejor opción en cuanto a pérdida de peso para un corto periodo de tiempo, no cumplía con un esquema nutricional tan completo como si lo hacía la DM.

## **CONCLUSIÓN**

Mediante el análisis de información científica se llega a determinar que el abordaje nutricional tanto prequirúrgico como postquirúrgico, garantiza el éxito total de la cirugía, potenciando el resultado del procedimiento, además de permitir una compensación apropiada en cuanto a los requerimientos energéticos del paciente y así evitar deficiencias nutricionales, por tanto, el seguimiento nutricional se presenta como un escalón necesario para mejorar el estilo de vida del paciente y evitar recaídas dietéticas y más bien supone un acondicionamiento fisiológico gastrointestinal con mejor tolerancia a través del tiempo ratificando los fines quirúrgicos bariátricos.

## **CONFLICTO DE INTERESES.**

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses para la publicación del presente artículo científico.

## **FINANCIAMIENTO**

Los autores declaran que no recibieron financiamiento externo.

## **AGRADECIMIENTOS**

Un agradecimiento especial a la Universidad Técnica de Ambato.

## **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

1. Ceballos J, Negrón R, Flores J, Vargas J, Ortega G, Madriz R, et al. Obesidad. Pandemia del siglo XXI. Rev sanid mil [Internet]. 2018 [citado el 12 de enero de 2023];72(5-6):332-338. Disponible en: [https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0301-696X2018000400332](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-696X2018000400332)

- 2.** WHO. Obesidad y sobrepeso [Internet]. 2021 [citado el 12 de enero de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
- 3.** PAHO. Nuevo informe de la ONU: el hambre en América Latina y el Caribe aumentó en 13,8 millones de personas en solo un año [Internet]. 2021 [citado el 12 de enero de 2023]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/30-11-2021-nuevo-informe-onu-hambre-america-latina-caribe-aumento-138-millones-personas#:~:text=El%20sobrepeso%20y%20la%20obesidad,Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe.>
- 4.** INEC. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. ENSANUT [Internet]. 2018 [citado el 12 de enero de 2023]. Disponible en: [https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas\\_Sociales/ENSANUT/ENSANUT\\_2018/Principales%20resultados%20ENSANUT\\_2018.pdf](https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/ENSANUT_2018/Principales%20resultados%20ENSANUT_2018.pdf)
- 5.** García S. Influencia de la cirugía bariátrica sobre antropometría, metabolismo y calidad de vida [Tesis Doctoral]. Universidad de Valladolid; 2020 [citado el 13 de enero de 2023]. Disponible en: <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/46437>
- 6.** Ballesteros JS, Hernández ID. Manejo y seguimiento nutricional de los pacientes con cirugía bariátrica en Colombia. *Revista de Nutrición Clínica y Metabolismo* [Internet]. 2018 [citado el 13 de enero de 2023];1(1):26-34. Disponible en: <https://doi.org/10.35454/rncm.v1n1.074>
- 7.** Palacio AC, Vargas P, Ghiardo D, Rios MJ, Vera G, Vergara C, et al. Primer Consenso chileno de nutricionistas en cirugía bariátrica. *Rev Chil Nutr* [Internet]. 2019 [citado el 14 de enero de 2023];46(1):64-75. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4067/s0717-75182019000100061>
- 8.** Osland E, Powlesland H, Guthrie T, Lewis CA, Memon MA. Micronutrient management following bariatric surgery: the role of the dietitian in the postoperative period. *Ann Transl Med* [Internet]. 2020 [citado el 14 de enero de 2023];8(Suppl 1):S9. <http://dx.doi.org/10.21037/atm.2019.0>
- 9.** Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista*

Española de Cardiología. el 1 de septiembre de 2021;74(9):790–9. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300893221002748>

**10.** Hernández J, Marrufo C, López F. Efectos metabólicos en pacientes obesos posoperados de bypass gástrico laparoscópico: 5 años de experiencia en un hospital de tercer nivel. *Cir Cir* [Internet]. 2018 [citado el 14 de enero de 2023];86(4):338-346. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30067711/>

**11.** Pardo B, Pérez E, Nieto N, Asbun J, Moreno M. Tratamiento nutricional hiperproteico precirugía bariátrica en obesidad mórbida. *Cir Cir* [Internet]. 2018 [citado el 14 de enero de 2023];86(6):508-514. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30361718/>

**12.** Nieto J, Ordorica R, Navarro B, Salgado B, Molina JM. Efectos sobre el perfil metabólico, el índice de masa corporal, la composición corporal y la comorbilidad en adolescentes con obesidad mórbida, que han fallado al manejo conservador para bajar de peso, operados de manga gástrica laparoscópica. Reporte del primer grupo de cirugía bariátrica pediátrica en México. *Gaceta Med Mex* [Internet]. 2018 [citado el 14 de enero de 2023];154(Suppl 2):S22-S29. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30532105/>

**13.** Johnson L, Ikramuddin S, Leslie D, Slusarek B, Killeen A. Analysis of vitamin levels and deficiencias in bariatric surgery patients: a single-institutional analysis. *Surg Obes Relat Dis* [Internet]. 2019 [citado el 18 de enero de 2023];15(7):1146-1152. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31202681/>

**14.** Damin D, Beato G, Crisp A, Junior I, Weber T, Oliveira M. Weight regain in association with macronutrient diet composition and quality of life in women at least 5 years after bariatric surgery. *Rev Chil Nutr* [Internet]. 2021 [citado el 18 de enero de 2023];48(5):698-706. Disponible en: [https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75182021000500698&script=sci\\_abstract&tlng=en](https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75182021000500698&script=sci_abstract&tlng=en)

**15.** Palacio AC, Quintiliano D, Vargas P, Consentino M, Ríos MJ. Ingesta calórica y de macronutrientes en los primeros seis meses post cirugía bariátrica. *Rev Med Chile* [Internet]. 2021 [citado el 18 de enero de 2023];49(2):229-236. Disponible en: <https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034->

98872021000200229&script=sci\_arttext#:~:text=Durante%20e1%20primer%20mes%20e1,6%C2%20B0%20mes%20de1%20BPG.

**16.** Ağbaba N, Özcan B, Ören G. Determining the relationship of diet quality with weight change, body mass index, and depression in women who had undergone sleeve gastrectomy: a cross-sectional descriptive study. *Rev Esp Nutr Hum Diet* [Internet]. 2021 [citado el 19 de enero de 2023];25(3):269-278. Disponible en: [https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S2174-51452021000300269&script=sci\\_abstract&tlng=en](https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S2174-51452021000300269&script=sci_abstract&tlng=en)

**17.** Godoy C, Silva L, Godoy E, Furtado M, Coelho D, Rocha L, Goveial A. Food Tolerance and Eating Behavior After Roux-en-Y Gastric Bypass Surgery. *Obes Surg* [Internet]. 2018 [citado el 19 de enero de 2023];28(6):1540-1545. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29623666/>

**18.** Gils A, Bonada A, Montero M, Rabassa A, Sabench F, Molina A, et al. Effects of Two Preoperative Weight Loss Diets on Hepatic Volume, Metabolic Parameters, and Surgical Complications in Morbid Obese Bariatric Surgery Candidates: a Randomized Clinical Trial. *Obes Surg* [Internet]. 2018 [citado el 24 de enero de 2023];28(12):3756-3768. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30109669/>

**19.** Sivakumar J, Chong L, Ward S, Sutherland T, Read M, Hii M. Body Composition Changes Following a Very-Low-Calorie Pre-Operative Diet in Patients Undergoing Bariatric Surgery. *Obes Surg* [Internet]. 2020 [citado el 24 de enero de 2023];30(1):119-126. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31529393/>

**20.** Erdem NZ, Ozelgun D, Taskin HE, Avsar FM. Comparison of a pre-bariatric surgery very low-calorie ketogenic diet and the Mediterranean diet effects on weight loss, metabolic parameters, and liver size reduction. *Sci Rep* [Internet]. 2022 [citado el 24 de enero de 2023];12(1):20686. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36450844/>

**21.** Lee C, Florea L, Sears C, Maruthur N, Potter J, Schweitzer M, et al. Changes in Gut Microbiome after Bariatric Surgery Versus Medical Weight Loss in a Pilot Randomized Trial. *Obes Surg* [Internet]. 2019 [citado el 24 de enero de 2023];29(10):3239-3245. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31256356/>

- 22.** De la Cruz N, Xie L, Quiroz HJ, Kutlu OC, Atem F, Lipshultz SE, Mathew MS, Messiah SE. Long-Term Outcomes after Adolescent Bariatric Surgery. *J Am Coll Surg* [Internet]. 2022 [citado el 25 de enero de 2023];235(4):592-602. <https://doi.org/10.1097/XCS.0000000000000325>
- 23.** Bandeira A, Carvalho M, Siqueira L, Santa-Cruz F, Marins J. Deficiências de micronutrientes após cirurgia bariátrica: análise comparativa entre gastrectomia vertical e derivação gástrica em Y de Roux. *Rev Col Bras Cir* [Internet]. 2018 [citado el 25 de enero de 2023];45(6): Disponible en: <https://www.scielo.br/j/rcbc/a/GVnxbXr5D9t7dHbP7BnLtQ/abstract/?lang=pt>
- 24.** Jans G, Devlieger R, De Preter V, Ameye L, Roelens K, Lannoo M, et al. Bariatric Surgery Does Not Appear to Affect Women`s Breast-Milk Composition. *J Nutr* [Internet]. 2018 [citado el 1 de febrero de 2023];148(7):1096-1102. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/jn/nxy085>